

PET-SLIT®

¡NOVEDAD!

INMUNOTERAPIA ESPECIFICA PERIORAL

Uno de los inconvenientes que el veterinario se puede encontrar a la hora de aplicar la inmunoterapia tradicional es la incomodidad de la aplicación subcutánea. Éste es uno de los motivos por el que algunos veterinarios y/o propietarios prefieren un tratamiento con inmunoterapia de aplicación oral que evita las inyecciones incómodas para algunos animales.

Los extractos acuosos glicerinados para administración por vía "oral" (sublingual o perioral), han demostrado tener eficacia. Siempre y cuando la concentración sea como mínimo 3 veces superior a la de la vía subcutánea.



SEGURIDAD

Mínimas reacciones secundarias

FACIL APLICACIÓN

Aplicador en spray perioral.

MÁS COMODIDAD

Administración a domicilio por parte del propietario.
Dosificación 5 días a la semana de Lunes a Viernes.

PRESENTACIÓN

Cada caja de PET-SLIT tiene una duración de 8 meses.
Contiene 2 frascos de 9 ml

1.- DeBoer, Verbrugge, Morris. Changes in mite-specific IgE and IgG levels during sublingual immunotherapy (SLIT) in dust mite-sensitive dogs with atopic dermatitis. (2010) Comunicación oral 24th annual Congress of the ECVI-ESVD (Florencia, Italia).

ALERGOVET

Pauta de Administración



1. Ante todo, tiene Usted que estar convencido de que es una excelente alternativa terapéutica.
2. Explique claramente al propietario el tipo de tratamiento que van a abordar.
3. El tratamiento de las enfermedades alérgicas debe de tener un enfoque integral. Para incrementar la eficacia de la inmunoterapia combínela con otras medidas complementarias como una dieta adecuada, control de pulgas e infecciones, baños frecuentes, etc.
4. Seleccione para la composición de la vacuna solamente aquellos alérgenos más relevantes por su alergenidad y frecuencia en el hábitat del animal.
5. Es posible que hasta que la inmunoterapia comience a hacer efecto, o como soporte en el mantenimiento, se tenga que combinar con otros tratamientos sintomáticos como ciclosporina o corticoides a dosis antiinflamatorias.
6. Mantenga como mínimo un año el tratamiento antes de abandonarlo por considerar que no es eficaz.
7. Mantenga el tratamiento durante 3 - 5 años para consolidar su eficacia. Un abandono prematuro podría provocar una recaída en el animal.

ALERGOVET



Luis Cabrera, 92 | 28002 Madrid | Tel. 91 413 44 72 | Fax 91 519 33 97 | email: info@alergovet.com | www.alergovet.com

